

Instrucciones para el cuidado posterior a la Extracción del Implante

Preventive Health Clinic: _____

Número de teléfono de Preventive Health Clinic: _____

Fecha de la extracción: _____

- Si empieza con un nuevo método anticonceptivo, use condones siempre que tenga relaciones sexuales por 7 días como método de respaldo, y continúe usando condones cada vez que tenga relaciones sexuales para prevenir las infecciones de transmisión sexual.
- Después de que desaparezca el entumecimiento en el brazo, puede sentir dolor por un día o dos donde se extrajo el implante. Puede usar analgésicos de venta libre (Tylenol, ibuprofeno) según las instrucciones del medicamento y compresas frías para ayudar a disminuir el dolor y la inflamación. **No use aspirinas.**
- Mantenga el vendaje de presión con gasa esterilizada por 24 horas y manténgalo seco. Después de 24 horas, puede quitar el vendaje o la gasa de presión.
- Las gasas esterilizadas deberían caerse del sitio de la incisión en el plazo de 3 a 5 días.
- Es posible que tenga inflamación, contusiones o decoloración por hasta dos semanas.
- Comuníquese con su clínica o proveedor médico de inmediato si le sucede lo siguiente:
 - Tiene rojez, calor, secreción o dolor permanente en la zona de extracción del implante.
 - Tiene fiebre (>101 °F [38,3 °C])

